



Събирателната точка -енергийно бавланиране на организма

След 2005 г. започнах да работя с книгата на д-р Джон Уейл „Събирателната точка - катализатор на силата на човека“. В нея се описва къде трябва да се намира събирателната точка (СТ), когато сме балансирани и какви са основните проблеми при изместването ѝ: в дясно, в ляво, нагоре или надолу.

Според моите раднестезични измервания и наблюдения, психическото и здравословно състояние на човека е в пряка зависимост от нейното положение. Основното, постоянното положение на СТ зависи от характера на съответния индивид, като според мен той се формира до 23-годишна възраст. В случай, че в детството подражаваме в поведението си на някой от нашите близки родственици, ние формираме подобен характер – а след време не е изключено да боледуваме от същите заболявания,

от които е боледувал и той; тогава лекарите говорят за наследствени заболявания. Ако, посредством промяна на мисленето и на поведението успеем да достигнем до балансирано състояние, при което организъмът ни работи добре, тогава няма да имаме проблеми със здравето си.

В случай на конкретно заболяване обаче, преди да се започне каквото и да е лечение, е необходимо да се установи къде се намира СТ и доколко нейното положение е свързано с характера, или доколко то е в резултат на моментно състояние.

В балансирано състояние СТ се намира в областта на тимусната жлеза по централния меридиан - т.19 при жените и т.18 при мъжете. Съществува и т.нар. критична линия, която преминава малко над пъпа.

Когато СТ е изместена надясно, независимо по кой меридиан, се формира хиперфункция на организма: индивидът е хиперактивен, нерядко страда от хормонални проблеми, организъмът му се износва по-бързо. (Обикновено това са затворени хора, гневни, жлъчни, работохолици, перфекционисти, ръководители-педанти).

Когато СТ е на меридиана на черния дроб (т.F14), наблюдава се хиперфункция на черния дроб: той не е в състояние да преработва пурините, лявата ни страна е по-слаба и в левия бъбрек се образуват прозрачни кристали на пикочна киселина, които по принцип трябва да се натрупват към хрущялите на палеца на десния крак. Това не винаги е така, те се насочват към места, където имаме разхлабени връзки вследствие на различни травми - колена, ябълки, рамене, лакти и др. Вследствие на тези кристали започва износване на хрущялите и мястото е болезнено и възпалено. Това заболяване е подагра. Според статистиките на Световната здравна организация 50% от населението страда от подагра. Заболяването трудно се открива и затова в повечето случаи се говори за артрит и ревматизъм. Остарели са схващанията, че болният от подагра е чревоугодник и с наднормено тегло – има случаи на много слаби хора и дори на деца с подагра – поне от лични наблюдения. Тези кристали постепенно разрушават хрущялите, а пикочната киселина в кръвта уврежда клапите на сърцето. Зрението също се нарушава, тъй като е свързано със състоянието на черния дроб.

Когато СТ е изместена извън тялото се наблюдават състояния на мания, паника ,тревожност и халюцинации.

Ако СТ е в лявата половина, то имаме отклонения като: депресия, забавяне функциите на организма, по-бавни действия, мисли и реакции вероятност за диабет.

Ако СТ е в ляво на меридиана на задстомашната жлеза, това определя депресивното състояние на индивида и е възможно да се развие диабет.

Когато СТ е близко до критичната линия, независимо на кой меридиан се намира, тогава са възможни суицидни (в повечето случаи чужди) мисли – т.е. мисли за самоубийство. Ако пък СТ се намира извън организма, то тогава е налице психично заболяване.

СТ на който меридиан се намира -този орган или система е с проблем. СТ се измества от негативни енергии / магии/ и стрес- колкото е по-силно негативното въздействие и стреса , толкова точката е по близко до критичната линия и тежка депрасия. Без да се намести СТ няма успех в лечението. Първо трябва да се направи енергиен баланс и след това да се лекува проблема.

Разработил съм собствена методика за наместване на СТ, но за трайни промени в поведенческите характеристики е необходимо организъмът да се балансира и да се поддържа в устойчиво състояние минимум 6 месеца. Желателно е след балансиране поне 1 път седмично да се проверява дали няма изместване.